

女性ホルモン製剤					
	卵胞ホルモン製剤				
		A. 天然卵胞ホルモン製剤			
			エストラジオールとその誘導体		
			エストラジオール《ジュリナ》	ジュリナ Julina(バイエル) 錠:0.5mg	【適応】 [1]更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う次の症状:血管運動神経症状(hot flush及び発汗), 腔萎縮症状 [2]閉経後骨粗鬆症 【用法】 [1]1日1回0.5mg ▶尚, 増量の際は1日1回1.0mg可 [2]1日1回1.0mg
			エストラジオール《エストラーナ》	エストラーナ Estrana(久光) テープ:0.09・0.18・0.36・0.72mg/枚	0.72mgを下腹部, 臀部のいずれかに貼付し, 2日毎に貼り替える [3]0.72mgから開始, 下腹部, 臀部のいずれかに貼付し, 2日毎に貼り替える(増減) [児]0.09mgから開始, 下腹部, 臀部のいずれかに貼付し, 2日毎に貼り替える. その後, 0.18mg, 0.36mg, 0.72mgへ段階的に増量
			エストラジオール《ディビゲ》	ディビゲル Divigel(ポーラ) ゲル:1mg/包	1日1回1mg1包(1.0g)を左右いずれかの大腿部もしくは下腹部に, 約400cm <sup>2</sup> の範囲に塗布
			エストラジオール《ル・エストロジェル》	ル・エストロジェル l'estroge(資生堂) ゲル:0.06% [0.54mg/1プッシュ(0.9g)] 80g/ボトル	1日1回2プッシュ(1.8g, エストラジオールとして1.08mg含有)を両腕の手首から肩までの広い範囲に塗擦(適減) ▶減量する場合は, 1プッシュ(0.9g, エストラジオールとして0.54mg含有)を両腕の手首から肩までの広い範囲に塗擦
			エストラジオールプロピオン酸エステル《オバホルモンデポー》	オバホルモンデポー Ovahormon depot(あすか) 筋注:5mg/1mL/A	1回1~10mg 1週~1カ月毎に筋注(増減)
					1回5~10mg 1~4週間毎に筋注(増減)
			エストラジオール吉草酸エステル《プロギノン・デポーペラニンデポー》	プロギノン・デポー Progynon depot(富士製) 筋注: 10mg/1mL/A ★ペラニンデポー Pelanin depot(持田) 筋注:5・10mg/1mL/A	
			エチニルエストラジオール《プロセキソール》	プロセキソール Prosexol(あすか) 錠:0.5mg	1回0.5~1.0mg 1日3回(増減) ▶再評価では1回0.05~1mg 1日3回
			エストリオールとそのエステル		

				エストロオール《エストロールホルリン》	エストロール Estriol(持田) 錠:0.1(100 $\gamma$ )・0.5・1mg ホルリン Holin(あすか) 錠:1mg 筋注用:10mg/1mL/A	[1]更年期障害, 膣炎(高齢者, 小児及び非特異性), 子宮頸管炎並びに子宮腔部びらん [2][[錠]0.5・1mg]老人性骨粗鬆症 [注]分娩時の頸管軟化 【用法】 [内][1]1回0.1~1mg 1日1~2回(増減) [2]1回1mg 1日2回(増減) [注]1日5~20mg 筋注(増減)
				エストロオール《エストロールホルリンV》	エストロール Estriol(持田) 2529 腔錠:0.5mg ★ホルリンV Holin V(あすか) 腔用錠:1mg エストロオール(富士製 [腔剤]0.5)	1日1回0.5~1mg 腔内挿入(増減)
				エストロオールプロピオン酸エステル《エストロールデポー》	エストロールデポー Estriol depot(持田) 注:10mg/1mL/A	[1]更年期障害, 膣炎(高齢者, 小児及び非特異性), 子宮頸管炎並びに子宮腔部びらん [2]分娩時の頸管軟化 【用法】 [1]1回5~10mg 7~10日毎に皮下注・筋注(増減) [2]1回10mg 筋注(増減)
			結合型エストロゲン製剤(止血剤)			
				結合型エストロゲン《プレマリン》	プレマリン Premarin(ファイザー) 錠:0.625mg	[1]卵巣欠落症状, 卵巣機能不全症, 更年期障害 [2]膣炎(高齢者, 小児および非特異性), 機能性子宮出血 【用法】 [1]1日0.625~1.25mg(増減) [2]1日0.625~3.75mg(増減)
	黄体ホルモン製剤					
		A. プロゲステロンとその誘導				
			プロゲステロン(略称:プロゲス)《プロゲホルモン ルテウム》	プロゲホルモン Proge hormon(持田) 筋注用:10・25mg/1mL/A ルテウム Luteum(あすか) 注:10・25mg/1・2mL/A プロゲステロン(富士製 [注]25/50)	【適応】 無月経, 月経困難症, 機能性子宮出血, 黄体機能不全による不妊症, 切迫流産, 習慣性流産 1日10~50mg 分1~2 筋注	
			プロゲステロン《ルティナス》	ルティナス Lutinus(フェリング) 腔錠:100mg(薬価基準未収載)	生殖補助医療における黄体補充 【用法】 1回100mgを1日2回又は3回, 採卵日(又はホルモン補充周期下での凍結胚移植ではエストロゲン投与により子宮内膜が十分な厚さになった時点)から最長10週間(又は妊娠12週まで)腔内に投与	

			ヒドロキシ プロゲステ ロンカプロ ン酸エステ ル《オオホ ルミンルテ ウムデポー プロゲデ ポー》	オオホルミンルテウ ムデポー Oophormin luteum depot(あすか) ★プロゲデポー Proge depot(持田) 筋注: 125mg/1mL/A プロゲストーンデポー (富士製 [注]125)	【適応】 無月経, 機能性子宮出血, 黄体機能不全による不妊症, 切迫流 早産, 習慣性流早産 【用法】 .1週1回65~125mg 筋注
			ジドロゲス テロン《デュ ファストン》	デュファストン Duphaston(マイラ ン) 錠: 5mg	[1]切迫流早産, 習慣性流早産, 黄体機能不全による不妊症, 月 経困難症, 機能性子宮出血, 無月経, 月経周期異常(稀発月経, 多発月経) [2]子宮内膜症 【用法】 [1]1日5~15mg 分1~3 [2]1日5~20mg
			メドロキシ プロゲステ ロン酢酸エ ステル《ヒス ロン プロ ベラ》	ヒスロン Hysron(協 和発酵キリン) 錠: 5mg [200mg錠 は抗癌剤 ⇒ ] ★プロベラ Provera(ファイザー) 錠: 2.5mg メドロキシプロゲス テロン酢酸エステル (ポーラ [錠]2.5), プ ロゲストーン(富士製 [錠]2.5/5), メドキロ ン(東和薬 [錠]2.5)	【適応】 無月経, 月経周期異常(稀発月経, 多発月経), 月経量異常(過少 月経, 過多月経), 機能性子宮出血, 黄体機能不全による不妊 症, 切迫流早産, 習慣性流早産 【用法】 1日2.5~15mg 分1~3
			クオルマジ ノン酢酸エ ステル《ルト ラール》	ルトラール Lutoral(富士製) 錠: 2mg	【適応】 無月経, 月経周期異常(稀発月経, 多発月経), 月経量異常(過少 月経, 過多月経), 月経困難症, 機能性子宮出血, 卵巣機能不全 症, 黄体機能不全による不妊症 【用法】 1日2~12mg 分1~3
		B. ノルテス トステロン 誘導体			
			ノルエチス テロン《ノア ルテン》	ノアルテン Norluten(富士製) 錠: 5mg	[通常]1日5~10mg 分1~2 [1]1日5mg ▶卵胞期に投与し, 数 日間連続投与 [2]1日5mg ▶月経予定5日前から開始し, 延長希 望日まで連続投与
	卵胞およ び黄体ホ ルモン配 合剤				
		A. カプロ ン酸ヒドロキ シプロゲス テロン系			

			合剤《E・P・ホルモンデポー》	E・P・ホルモンデポー E・P・Hormone depot(あすか) 筋注: 1A(1mL)中 ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル50mg, エストラジオールプロピオン酸エステル1mg	【適応】 無月経, 機能性子宮出血 【用法】週1回1mL 筋注(増減)
			合剤《ルテステポー》	ルテステポー Lutes depot(持田) 注: 1A(1mL)中 ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル125mg, エストラジオール安息香酸エステル10mg	【適応】 機能性子宮出血 【用法】.1回1mL 筋注(増減)
		B. ノルエチステロン			
			合剤《ソフィア》	ソフィア Sophia(あすか) A配合錠: ノルエチステロン1mg, メストラノール0.05mg C配合錠: ノルエチステロン2mg, メストラノール0.1mg	【A配合錠】 [1]月経周期異常(稀発, 頻発, 不順), 無月経, 月経量異常, 月経困難症, 月経前緊張症, 更年期障害, 機能性不妊症 [2]機能性子宮出血, 月経周期変更 【C配合錠】 [1]機能性子宮出血, 無月経 [2]月経量異常(過少月経, 過多月経), 月経周期異常(稀発月経, 多発月経), 月経困難症 [3]卵巣機能不全による不妊症 【用法】 【A配合錠】[1]1日1錠(増減) [2]1日2~4錠 分1~2(増減) 【C配合錠】[1]1日1~2錠 7~10日間連続 [2]1日1錠 月経周期第5日より約3週間連続 [3]1日1錠 月経周期第5日より約3週間連続投与し, 次の周期に妊娠成立を期す
			合剤《ルナベル》	ルナベル Lunabell(ノーベル) 配合錠LD: ノルエチステロン1mg, エチニルエストラジオール0.035mg 配合錠ULD: ノルエチステロン1mg, エチニルエストラジオール0.02mg フリウエル(持田 配合錠LD)	【適応】 月経困難症 【用法】 1日1錠を毎日一定の時刻に21日間経口投与し, その後7日間休薬. 以上28日間を投与1周期とし, 出血が終わっているか続いているかにかかわらず, 29日目から次の周期の錠剤を投与し, 以後同様に繰り返す
			合剤《メノエイド》	メノエイド Menoaid(あすか) コンビパッチ: エストラジオール0.62mg・酢酸ノルエチステロン2.70mg/枚	【適応】 更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う血管運動神経系症状(Hot flush及び発汗) 【用法】 1枚を3~4日毎に1回(週2回)下腹部に貼付
		C. クロルマジノン酢酸エステル			



		テストステロンエナン ト酸エステル《エナル モンデポー テストチノ ンデポー テ ストロンデ ポー》			エナルモンデポー Enarmon depot(あ すか) 筋注: 125・ 250mg/1mL/A ★テストチノンデポー Testinon depot(持 田) 筋注用: 125・ 250mg/1mL/A ★テストロンデポー Testoron depot(富 士製) 筋注: 250mg/1mL/A	【適応】 [1]男性性腺機能不全(類宦官症) [2]造精機能障害による男性不妊症 [3]再生不良性貧血, 骨髄線維症, 腎性貧血 【用法】 [1]1回100mg 7~10日間毎, 又は 1回250mg 2~4週間毎に筋 注 [2]1回50~250mg 2~4週間毎に無精子状態になるまで筋注 [3]1回100~250mg 1~2週間毎に筋注 ▶いずれの場合も増減
両性混 合ホル モン製 剤						
		合剤《ボ セルモン》			ボセルモン Bothermon(あすか) 水懸注: 1A(1mL) 中 5mg(テストステ ロン4.76mg, エスト ラジオール0.24mg)	【適応】 更年期障害 【用法】 1回1~2mL 1日1回又は隔日 筋注・皮下注(増減)
		合剤《ダ イホルモ ン・デポー プリモジ アン・デ ポー》			ダイホルモン・デ ポー Dihormon depot(持田) ★プリモジアン・デ ポー Primodian depot(富士製) 筋注: 1A(1mL)中 テストステロンエナ ント酸エステル 90.2mg, エストラジ オール吉草酸エス テル4mg	更年期障害、卵巣欠落症状、骨粗鬆症、 1回1mL、2-4週毎、筋注増減
		合剤《ボ セルモンデ ポー》			ボセルモンデポー Bothermon depot(あすか) 筋注: 1A(1mL)中 テストステロンエナ ント酸エステル 40mg, テストステロ ンプロピオン酸エス テル9mg, エストラ ジオール吉草酸エ ステル1mg	【適応】 更年期障害, 骨粗鬆症 【用法】 1回1mL 2~4週毎 筋注(増減)