

クラミジア：

分泌物： サラサラ（淋菌：ドロドロ）

感染： 淋菌との合併感染

症状： 男：感染当日より、女：2週間後、
上行感染・内性器感染症による不妊症、

診断： 尿中、頸管粘液PCR

治療： 2週間～数カ月

(A) 子宮頸管炎（妊婦でも有益時に使用可能）：マクロライド：

1) アジスロマイシン水和物 azithromycin hydrate(AZM)、ジスロマック Zithromac(ファイザー)、錠：250mg カプセル：小児用 100mg、細粒：小児用 10% 100mg/g(1g/包)
ドライシロップ：SR 成人用ドライシロップ 2g/瓶、600mg 錠[薬価]ジスロマック：錠 (¥847.9/600mg)、アジスロマイシン(各社 [錠]250[カ]小児用 100[細]小児用 10%、高田 [錠]小児用 100、東和薬 [錠]500、日医工 [錠]500)、[薬価]ジスロマック：錠 (¥246.2/250mg)、

カプセル小児用(¥188.3)、細粒小児用(¥275.9/100mg/g)、SR 成人用ドライシロップ (¥2,055.7/2g/V)

ジスロマック ⇒ 錠 (250mg) 1回4錠 1日1回1日間 食後

2) ジスロマック SR 成人用ドライシロップ 1回 2,000mg (成分量として) 1日1回
1日間 用時水で懸濁し空腹時投与

クラリスロマイシン (クラリス、クラリシッド) 400mg, 2x, 7日

キノロン (妊婦禁忌)：レボフロキサシン (クラビット)

500mg, 1x, 7日

シタフロキサシン (グレートビット) 200mg, 2x, 7日

テトラサイクリン：妊婦禁忌、頸管炎は保険適応外、ミノサイクリン (ミノマイシン)

200mg, 2x, 7日

ドキシサイクリン (ビブラマイシン) 200mg, 2x, 7日

(B)骨盤内炎症性疾患 (点滴静注、点滴静注から経口投与へのスイッチ療法) 処方例

下記のいずれかを用いる。

マクロライド：

1) アジスロマイシン水和物 azithromycin hydrate(AZM)、ジスロマック Zithromac(ファイザー)、注：点滴静注用 500mg/V(アジスロマイシンとして)、[薬価]ジスロマック：点

滴静注用(¥2,535/500mg/V) ジスロマック ⇒ 注 1 回 500mg 1 日 1 回 2 時間かけて点滴
静注 1~2 日間投与後、患者の状態によりジスロマック ⇒ 錠 1 回 250mg 1 日 1 回に切
り替え 総投与期間は 7 日間

2) レボフロキサシン水和物 levofloxacin(LVFX)、クラビット Cravit(第一三共)、錠：
250・500mg(レボフロキサシンとして)、細粒：10%(レボフロキサシンとして)(2.5g/包)

1 / 2

nrec

クラミジア

2019/04/27

注：点滴静注 500mg/20mL/V, 点滴静注バッグ 500mg/100mL/(レボフロキサシンとして)、
レボフロキサシン(各社 [錠]250/500, 第一三共エスファ [細]10%, 東和薬 [OD 錠]250/500,
[液]25mg/mL(10mL/1 包), 持田 粒状[錠]250/500)、[薬価]クラビット：錠 (¥234.2/250mg,
¥415.7/500mg), 細粒(¥108/100mg/g), 点滴静注(¥5,325/500mg/20mL/V), 点滴静注バッ
グ(¥5,417/500mg/100mL/キット)、クラビット Cravit(第一三共) 錠：250・500mg(レボフ
ロキサシンとして) 細粒：10%(レボフロキサシンとして)(2.5g/包) 注：点滴静注
500mg/20mL/V, 点滴静注バッグ 500mg/100mL/(レボフロキサシンとして)

レボフロキサシン(各社 [錠]250/500, 第一三共エスファ [細]10%, 東和薬 [OD 錠]250/500,
[液]25mg/mL(10mL/1 包), 持田 粒状[錠]250/500)、[薬価]クラビット：錠 (¥234.2/250mg,
¥415.7/500mg), 細粒(¥108/100mg/g), 点滴静注(¥5,325/500mg/20mL/V), 点滴静注バッ
グ(¥5,417/500mg/100mL/キット)

クラビット 注 1 回 500mg 1 日 1 回 1 時間かけて点滴静注 3 日間投与後、患者の状態によ
りクラビット 錠 1 回 500mg 1 日 1 回に切り替え 総投与期間は 14 日間

ミノサイクリン (ミノマイシン) 200mg, 2x, 3-5 日 点滴

