

- 1) 分泌物： ドロドロ黄色（クラミジア：サラサラ）
- 2) 診断： 白血球内細菌、PCR
- 3) クラミジア感染合併
- 4)
- 5) 治療： 淋菌+クラミジアは、両者の加療
- 6)
- 7) セフトリアキソンナトリウム水和物 ceftriaxone sodium hydrate(CTRX) ロセフィン Rocephin(中外) 注：静注用 0.5・1g/V キット：点滴静注用 1g バッグ(生食液 100mL 付) セフトリアキソンナトリウム(ファイザー [Kit]1g, ニプロ [静]0.5/1g[Kit]1g, 日医工 [静]0.5/1g), セフトリアキソン Na(各社 [静]0.5/1g), セフキソン(シオノ [静]0.5/1), リアソフィン(ケミックス [静]0.5/1)
[薬価]ロセフィン：静注用(¥498/0.5g/V, ¥750/1g/V), バッグ(点滴静注用)〔¥1,145/1g/キット(生理食塩液 100mL 付)〕 ロセフィン ⇒ 注 1 回 1g 1 日 1 回 静注 単回投与
- 8) スペクチノマイシン 塩酸塩水和物 spectinomycin hydrochloride hydrate(SPCM) トロビシン Trobicin(ファイザー) 注：筋注用 2g/V
[薬価]トロビシン：筋注用(¥2,407/2g/V)
トロビシン ⇒ 注 1 回 2g 殿部筋注 単回投与