



妊娠・分娩・産褥における血液量，血漿量，血球量の変化

(鈴木正彦：周産期医学，26：1348-1354，1996)

妊婦における末梢血の変化 (mean±SD) (全国アンケート無治療データ 7,659 例)

	妊娠初期	妊娠中期	妊娠後期
RBC ($\times 10^4/\mu\text{L}$)	418±35	379±31	388±34
Ht (%)	37.1±2.9	34.4±2.6	34.4±2.7
Hb (g/dL)	12.5±1.0	11.6±0.9	11.4±0.9
網赤血球数 (%)	6.2±3.2	5.5±3.3	5.5±3.4
フェリチン (ng/mL)	34±27	19±16	13±14
TIBC ($\mu\text{g/dL}$)	320±75	432±83	493±109
血清鉄 ($\mu\text{g/dL}$)	112±39	92±40	66±36
鉄飽和率 (%)	38±21	23±12	15±10
MCV (fL)	88.9±5.0	90.9±4.9	88.9±5.7
MCH (pg)	30.0±1.9	30.6±1.8	29.6±2.3
MCHC (%)	33.7±1.3	33.7±1.3	33.3±1.3
WBC ($/\mu\text{L}$)	7,410±1,870	8,340±1,970	8,180±1,980
血小板数 ($\times 10^4/\mu\text{L}$)	23.8±5.8	24.0±5.8	23.8±6.3
総タンパク (g/dL)	7.0±0.5	6.5±0.4	6.4±0.4

RBC：赤血球数，Ht：ヘマトクリット，Hb：ヘモグロビン，TIBC：総鉄結合能，MCV：平均赤血球容積，MCH：平均赤血球ヘモグロビン量，MCHC：平均赤血球ヘモグロビン濃度，WBC：白血球数。

(金岡 毅：ペリネイタルケア，9：101-108，1990)